

여드름약, 이소트레티노인 이것만은 꼭~



이소트레티노인은
태아에게 심각한
기형 유발 가능



중증의 여드름 치료제, 이소트레티노인!


이소트레티노인은 처방 받기 전에
환자의 임신 가능성 확인 및 안전사용 안내가 반드시 필요한
중증의 여드름 치료제입니다.

안전사용 안내


- ✓ 환자의 임신 가능성 확인
- ✓ 태아 기형 위험성 확인
- ✓ 피임기간 / 방법 확인
- ✓ 헌혈금지 / 나눠먹기 금지

이소트레티노인은 왜 위험하나요?


이소트레티노인 **치료중 또는 치료 종료후 1개월 이내 임신 될 경우,**
태아의 심각한 기형 및 자연 유산을 유발할 수 있습니다
임신 가능성이 있다면 반드시 의사에게 알려야 합니다.




수두증




소두증



지능저하



무이증



소안구증



구순/구개열
[입술/입천장갈림증]

주요 태아 기형 : 두개골 이상, 뇌기형, 소뇌기형, 수두증, 무뇌수두증, 소두증, 뇌신경 이상,
외이이상, 소안구증, 심혈관계이상, 안면이형증, 구개열, 흉선 및 부갑상선기형 등

안전하게 이소트레티노인을 사용하기 위해선

1 | 의사 상담은 필수

이소트레티노인의 **기형 위험성** 및 **안전 사용 수칙**에 대한 **충분한 설명과 확인**은 필수예요.

☒ 임신 여부(가능성) 확인

☒ 기형 위험성 이해


☒ 피임 필요성 이해

☒ 동의서 서명

* 필요시 레티노이드계가 아닌 다른 여드름 치료제를 처방받을 수 있어요.(경구용 항생제, 외용제 등)

2 | 의사와 상담 시 임신 여부 알리기


여드름 치료 시, **임신 가능성이 있다면 반드시 의사에게 알려주세요.**



안전하게 이소트레티노인을 사용하기 위해선

3 | 복용 전후 피임기간 지키기


이소트레티노인 복용 **최소 한달 전부터 마지막 복용 후 최소 한달까지** 반드시 피임을 해야해요.



4 | 복용 동안 효과적인 피임법 선택하기

이소트레티노인 복용 중에는 **2가지 이상의 피임법을 함께** 사용하는 것을 권장해요.

비호르몬피임법(남성형 콘돔, 자궁 경부 캡, 구리자궁내장치 등), 호르몬피임법(경구피임제, 자궁내장치, 피하이식제 등), 시술 등



안전하게 이소트레티노인을 사용하기 위해선

5 | 헌혈 금지

이소트레티노인 복용 시작 부터
마지막 복용 후 최소 한 달까지
헌혈해서는 안 돼요.



6 | 나눠먹기 금지


복용하고 남은 이소트레티노인을
다른 사람에게 나눠주거나
인터넷으로 판매하면 안돼요.



국내에서 사용 중인 이소트레티노인 성분 의약품

(15개 품목/경구제, '23년 1월 기준)


연번	품목명	업체명
1	니메겐연질캡슐 (이소트레티노인)	㈜메디카코리아
2	레씨범연질캡슐 (이소트레티노인)	위더스제약㈜
3	로이탄연질캡슐 (이소트레티노인)	㈜마더스제약
4	아키놀연질캡슐 (이소트레티노인)	아주약품㈜
5	오피큐탄연질캡슐 (이소트레티노인)	㈜아이월드제약
6	우리큐탄연질캡슐 (이소트레티노인)	㈜팜젠사이언스
7	이소탐연질캡슐 (이소트레티노인)	성원애드콕제약㈜
8	이소트렌연질캡슐 (이소트레티노인)	고려제약㈜
9	이소티논연질캡슐10밀리그램 (이소트레티노인)	한미약품㈜
10	제로큐탄연질캡슐 (이소트레티노인)	제이더블유신약㈜
11	트레논연질캡슐 (이소트레티노인)	㈜동구바이오제약
12	트레인연질캡슐 (이소트레티노인)	㈜제뉴파마
13	트레틴연질캡슐10mg (이소트레티노인)	코오롱제약㈜
14	핀플연질캡슐 (이소트레티노인)	주식회사 더유제약
15	트레논연질캡슐5밀리그램 (이소트레티노인)	㈜동구바이오제약



우리 모두가 안전하게
의약품을 사용할 수 있도록
의심되는 부작용을
보고해 주세요!



1644-6223, 14-3330



의약품안전나라(nedrug.mfds.go.kr)



식품의약품안전처



한국의약품안전관리원