

자궁경부암 예방접종 안내문

예방접종으로 자궁경부암을 예방하세요

2016년 6월부터 「건강여성 첫걸음 클리닉 사업」 참여 의료기관(전국 255개 보건소 포함)을 통해 자궁경부암 예방접종이 만 12세 여아(03~04년생)를 대상으로 무료로 접종됩니다.

※ 참여 의료기관은 예방접종도우미(<http://nip.cdc.go.kr>) 또는 보건소 홈페이지에서 확인 가능

사람유두종바이러스는 (Human papillomavirus, HPV)

생식기 감염을 일으키는 흔한 바이러스로, 성생활을 시작한 여성 4명 중 2~3명은 평생 적어도 한 번 이상 HPV에 감염 될 수 있습니다.

대부분 증상 없이 자연적으로 사라지지만, 암을 일으킬 위험성이 높은 유전형 (HPV 16, 18 등)에 지속적으로 감염될 경우 수년에서 수십 년 후 자궁경부암으로 진행될 수 있습니다.

국가예방접종에 포함된 두 가지 백신은 백신에 포함된 유형에 의해 발생하는 70%의 자궁경부암을 효과적으로 예방 합니다.

자궁경부암 예방접종은

만 12세에 권장되며, 권장 접종간격을 유지하여 2회 접종을 완료하는 것이 중요 합니다.

자궁경부암 예방접종으로 사용되고 있는 백신은 지금까지 전세계 65개국에서 국가예방접종으로 도입하여 약 2억 건 이상 접종되었으며, 안전성이 검증된 백신입니다.



권장 접종시기 및 대상

해당 연도에 만 12세이거나 만 12세에 달하게 되는 여아



권장 접종횟수

6개월 간격으로 2회 접종

만 14~15세(백신별로 차이) 이상에서 1차 접종 시 3회 접종 필요



접종대상 백신

가다실, 서바릭스

예방접종 시 동일한 백신으로 접종을 완료하도록 합니다.



예방접종 주의사항

- 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받도록 합니다.
- 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- 예방접종 후 심한 알레르기 반응이 있는지 주의 깊게 관찰이 필요합니다.

청소년에서 백신 접종 후 통증으로 일시적으로 실신하는 경우가 있을 수 있으나 이는 다른 예방접종 후에도 발생할 수 있으며 충분히 예방이 가능합니다. 발생 시 넘어지면서 다칠 수 있으므로 예방접종 후 20~30분 동안 접종기관에 앉아 있거나 누워있도록 합니다.

이럴 땐 접종하면 안됩니다.

- 백신 성분 또는 이전 접종 후 심한 알레르기 반응을 보인 경우
※ 급성 열성질환에 걸린 경우에는 회복될 때까지 접종을 연기하는 것이 좋습니다. 그러나 감기와 같은 가벼운 질환 때문에 접종을 연기할 필요는 없습니다.

자궁경부암 예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- 국소 반응: 접종부위 통증, 부어오름, 발적, 두드러기 등
- 전신 반응: 발열, 메스꺼움, 근육통 등
※ 예방접종 후 심한 알레르기 반응이 나타날 수 있지만 매우 드뭅니다.

○ 예방접종 후 이상반응이 발생하면 신고해 주세요.

- 예방접종 후 생기는 대부분의 이상반응은 가볍고 수일 내에 회복됩니다. 다만, 증상이 심해지거나 장기간 지속되는 경우 또는 그 밖에 다른 전신 이상반응이 생기는 경우에는 즉시 의료기관을 방문하여 진료를 받고 보건소 또는 예방접종 도우미사이트 (<http://nip.cdc.go.kr>)를 통해 '예방접종 후 이상반응'으로 신고해 주세요.
- 국가에서는 예방접종 후 이상반응에 대한 피해보상 신청 시, 예방접종과의 관련성을 심의하여 관련성이 인정되는 경우 진료비를 보상하는 「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있습니다.